

**EMISE**

2 0 1 8

Resumen ejecutivo total  
N A C I O N A L

Secretaría de  
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social  
Presidencia de la Nación

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal de la tercera Encuesta Mundial de Salud Escolar 2018 (EMSE 2018) es proporcionar datos precisos sobre comportamientos relativos a la salud y los factores de riesgo y de protección entre estudiantes de Argentina para: diseñar estrategias sanitarias, establecer prioridades y formular políticas de salud escolar y adolescentes; servir de insumo a los gobiernos provinciales y nacionales así como también a organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para realizar comparaciones, entre los países y a nivel nacional y provincial, sobre la prevalencia de los comportamientos relativos a salud y factores protectores; analizar tendencias y comparaciones a nivel nacional y provincial en relación con las ediciones anteriores de la encuesta; y contribuir a la vigilancia epidemiológica y monitoreo de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.

La Encuesta Mundial de Salud Escolar utiliza una metodología estandarizada a nivel mundial para relevar datos sobre aspectos sociodemográficos e indaga sobre conductas relacionadas con el comportamiento alimentario, el consumo de alcohol y otras drogas, la violencia y daños no intencionados, la seguridad vial, la salud mental, el consumo de tabaco, la actividad física, los comportamientos sexuales y los factores de protección. La tercera edición en nuestro país, llevada a cabo por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, contó con la colaboración de los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales, la OPS/OMS Argentina, OPS/OMS Washington y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La encuesta fue realizada entre los meses de mayo y diciembre de 2018. Al igual que la segunda edición realizada en 2012, los resultados de la 3° edición son representativos a nivel provincial y nacional. La importancia de esta tercera edición de EMSE Argentina radica en que por primera vez en nuestro país se amplió el rango etario de la población estudiada, abarcando a estudiantes de 13 a 17 años (hasta el momento se incluían estudiantes de 13 a 15 años).

Para el desarrollo del trabajo de campo de la 3° Encuesta Mundial de Salud Escolar se utilizó un diseño de muestreo en dos etapas (selección de escuelas y luego de divisiones al azar) para producir una muestra representativa de alumnos de 1° a 5° año de educación media a nivel nacional (8° EGB a 3° polimodal en el caso de la provincia de Buenos Aires) y provincial. Se relevaron 523 escuelas en todo el país y se encuestaron 57.095 alumnos de los cuales se analizaron 56.981 cuestionarios correspondientes a las edades de 13 a 17 años, con una tasa de respuesta global de 63%.

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

	Estudiantes 13-15 años			Estudiantes 16-17 años			Estudiantes 13-17 años		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Consumo de alcohol</b>									
Porcentaje de estudiantes que bebieron alcohol durante los últimos 30 días.	<b>47.7</b> (46.1-49.4)	44.9 (43.1-46.8)	50.3 (48.3-52.3)	<b>67.6</b> (65.6-69.5)	68.1 (65.4-70.8)	67.2 (65.1-69.2)	<b>54.1</b> (52.7-55.4)	52.3 (50.6-54.1)	55.7 (54.2-57.2)
Porcentaje de estudiantes que se emborracharon alguna vez en la vida.	<b>28.5</b> (26.9-30.2)	26.1 (23.9-28.4)	30.7 (28.9-32.5)	<b>56.0</b> (54.0-58.0)	55.8 (52.9-58.7)	56.3 (54.5-58.1)	<b>37.3</b> (35.6-39.0)	35.6 (33.3-37.9)	38.8 (37.2-40.4)
Porcentaje de estudiantes que bebieron alcohol antes de los 14 años de edad (de los que bebieron alguna vez).	<b>77.1</b> (75.9-78.4)	79.7 (77.9-81.5)	74.7 (73.0-76.4)	<b>46.4</b> (44.5-48.4)	51.9 (49.3-54.5)	41.3 (39.0-43.7)	<b>65.7</b> (64.3-67.0)	69.2 (67.5-70.9)	62.4 (60.5-64.3)
Porcentaje de estudiantes que bebieron por lo general 2 o más tragos los días que bebieron alcohol (entre aquellos que bebieron alcohol en los últimos 30 días)	<b>63.1</b> (61.1-65.1)	60.4 (58.2-62.5)	65.4 (62.2-68.4)	<b>73.9</b> (71.7-75.9)	73.1 (70.2-75.8)	74.7 (72.2-77.0)	<b>67.3</b> (65.5-69.0)	65.5 (63.9-67.0)	68.9 (66.3-71.4)
<b>Peso corporal</b>									
Porcentaje de estudiantes con bajo peso (<-2DE de la media para IMC según edad y sexo).	<b>2.3</b> (1.9-2.7)	2.6 (2.1-3.2)	2.1 (1.5-2.9)	<b>2.0</b> (1.5-2.6)	2.2 (1.5-3.1)	1.7 (1.2-2.5)	<b>2.2</b> (1.9-2.5)	2.4 (2.0-2.9)	1.9 (1.5-2.5)
Porcentaje de estudiantes con sobrepeso (>+1DE de la media para IMC según edad y sexo).	<b>33.1</b> (31.9-34.3)	39.1 (37.3-40.9)	27.8 (25.5-30.2)	<b>25.1</b> (23.1-27.1)	27.9 (25.1-31.0)	22.5 (20.7-24.3)	<b>30.3</b> (29.1-31.4)	35.1 (33.8-36.5)	25.9 (24.2-27.7)
Porcentaje de estudiantes con obesidad (>+2DE de la media para IMC según edad y sexo).	<b>7.8</b> (7.2-8.4)	10.6 (9.6-11.8)	5.3 (4.6-6.0)	<b>6.6</b> (5.9-7.4)	8.1 (7.0-9.4)	5.2 (4.3-6.2)	<b>7.4</b> (6.9-7.8)	9.8 (9.2-10.4)	5.2 (4.8-5.7)

	Estudiantes 13-15 años			Estudiantes 16-17 años			Estudiantes 13-17 años		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Alimentación</b>									
Porcentaje de estudiantes que consumieron frutas 2 o más veces al día durante los últimos 7 días.	<b>21.9</b> (20.9-22.8)	22.0 (20.7-23.4)	21.6 (20.4-22.9)	<b>19.1</b> (18.1-20.2)	17.0 (15.2-19.0)	21.0 (19.5-22.5)	<b>21.0</b> (20.2-21.8)	20.4 (19.5-21.4)	21.4 (20.4-22.4)
Porcentaje de estudiantes que consumieron verduras 3 o más veces al día en los últimos 7 días.	<b>10.7</b> (10.0-11.5)	10.4 (9.5-11.4)	11.0 (10.2-11.9)	<b>9.9</b> (9.1-10.8)	9.4 (8.4-10.5)	10.3 (9.0-11.8)	<b>10.5</b> (10.0-11.0)	10.1 (9.4-10.8)	10.8 (10.2-11.4)
Porcentaje de estudiantes que consumieron bebidas azucaradas 1 o más veces al día en los últimos 7 días.	<b>34.0</b> (32.7-35.4)	36.0 (34.3-37.7)	32.1 (30.5-33.7)	<b>31.3</b> (29.5-33.1)	32.7 (30.7-34.8)	29.9 (27.5-32.4)	<b>33.2</b> (31.9-34.5)	34.9 (33.5-36.4)	31.4 (29.8-33.0)
Porcentaje de estudiantes que consumieron en lugares de comida rápida 3 o más días en los últimos 7 días.	<b>10.7</b> (9.8-11.6)	10.5 (9.4-11.8)	10.7 (9.6-12.0)	<b>8.4</b> (7.4-9.5)	8.5 (7.0-10.4)	8.1 (7.2-9.1)	<b>9.9</b> (9.3-10.7)	9.9 (9.1-10.8)	9.9 (9.1-10.8)
<b>Consumo de drogas</b>									
Porcentaje de estudiantes que consumieron marihuana una o más veces durante su vida.	<b>8.2</b> (7.4-9.2)	8.4 (7.3-9.7)	7.9 (6.9-9.1)	<b>24.3</b> (22.4-26.4)	27.0 (24.3-29.8)	21.9 (19.9-24.0)	<b>13.3</b> (12.1-14.6)	14.3 (12.9-15.7)	12.3 (11.0-13.7)
Porcentaje de estudiantes que consumieron marihuana una o más veces en los últimos 30 días	<b>6.2</b> (5.5-6.9)	6.7 (5.8-7.9)	5.5 (4.7-6.5)	<b>15.4</b> (14.0-16.9)	17.9 (15.8-20.1)	13.1 (11.6-14.7)	<b>9.1</b> (8.3-10.0)	10.3 (9.2-11.5)	7.9 (7.1-8.8)
Porcentaje de estudiantes que consumieron drogas alguna vez antes de los 14 años (entre aquellos que consumieron alguna vez).	<b>54.6</b> (50.4-58.8)	56.7 (50.5-62.8)	52.2 (47.9-56.5)	<b>25.5</b> (22.3-29.1)	30.8 (26.4-35.6)	19.2 (15.9-23.0)	<b>38.6</b> (35.9-41.4)	42.0 (38.5-45.6)	34.4 (31.6-37.4)

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

	Estudiantes 13-15 años			Estudiantes 16-17 años			Estudiantes 13-17 años		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Salud mental</b>									
Porcentaje de estudiantes que consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse en los últimos 12 meses.	<b>21.6</b> (20.7-22.4)	13.0 (12.0-14.1)	29.3 (28.1-30.6)	<b>21.3</b> (20.1-22.5)	15.1 (13.5-16.7)	27.0 (25.3-28.8)	<b>21.5</b> (20.8-22.2)	13.7 (12.9-14.5)	28.6 (27.7-29.6)
Porcentaje de estudiantes que intentaron suicidarse al menos una vez en los últimos 12 meses.	<b>15.5</b> (14.6-16.4)	10.4 (9.3-11.6)	19.9 (18.9-21.1)	<b>14.5</b> (13.2-16.0)	11.2 (10.0-12.7)	17.4 (15.7-19.3)	<b>15.2</b> (14.4-16.0)	10.7 (9.8-11.6)	19.1 (18.2-20.1)
Porcentaje de estudiantes que no tiene amigos muy cercanos.	<b>5.1</b> (4.7-5.6)	5.5 (5.0-6.1)	4.8 (4.2-5.4)	<b>6.5</b> (5.8-7.2)	6.6 (5.6-7.8)	6.3 (5.5-7.3)	<b>5.6</b> (5.2-5.9)	5.9 (5.4-6.4)	5.3 (4.8-5.8)
<b>Actividad física</b>									
Porcentaje de estudiantes que estuvieron activos al menos 60 minutos por día durante los últimos siete días.	<b>16.9</b> (16.1-17.7)	20.5 (19.4-21.7)	13.5 (12.7-14.3)	<b>15.7</b> (14.7-16.8)	20.0 (18.5-21.6)	11.7 (10.5-13.1)	<b>16.5</b> (15.8-17.3)	20.4 (19.3-21.4)	12.9 (12.2-13.6)
Porcentaje de estudiantes que fueron a clases de educación física en la escuela 3 o más días a la semana durante el último año escolar.	<b>37.9</b> (36.2-39.7)	40.8 (38.6-43.0)	35.2 (33.3-37.1)	<b>36.5</b> (34.5-38.7)	39.2 (36.9-41.6)	34.2 (31.7-36.8)	<b>37.5</b> (35.9-39.0)	40.3 (38.6-41.9)	34.9 (33.0-36.7)
Porcentaje de estudiantes que pasaron 3 o más horas sentados durante un día típico habitual.	<b>53.8</b> (51.8-55.7)	51.2 (49.2-53.2)	56.3 (54.1-58.4)	<b>58.6</b> (56.6-60.5)	56.3 (53.3-59.2)	60.8 (59.2-62.4)	<b>55.3</b> (53.6-57.0)	52.8 (51.0-54.7)	57.7 (55.9-59.5)
<b>Factores protectores</b>									
Porcentaje de estudiantes que faltaron a la escuela sin permiso una o más veces en los últimos 30 días.	<b>26.3</b> (24.3-28.5)	27.9 (26.0-29.9)	24.7 (22.2-27.3)	<b>36.7</b> (34.3-39.2)	39.4 (36.5-42.4)	34.0 (31.4-36.7)	<b>29.6</b> (27.7-31.7)	31.6 (29.7-33.5)	27.7 (25.3-30.1)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores siempre o casi siempre comprendieron sus problemas y preocupaciones en los últimos 30 días.	<b>42.8</b> (41.3-44.4)	44.5 (42.9-46.1)	41.5 (39.6-43.3)	<b>38.3</b> (36.8-39.9)	39.8 (37.4-42.3)	37.1 (34.9-39.3)	<b>41.4</b> (40.1-42.8)	43.0 (41.5-44.5)	40.1 (38.5-41.6)

	Estudiantes 13-15 años			Estudiantes 16-17 años			Estudiantes 13-17 años		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Factores protectores</b>									
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores sabían realmente lo que hacían en su tiempo libre siempre o casi siempre en los últimos 30 días.	<b>55.3</b> (53.7-57.0)	53.8 (51.8-55.8)	56.8 (54.5-59.2)	<b>54.5</b> (53.0-55.9)	51.9 (49.5-54.3)	57.2 (55.3-59.1)	<b>55.1</b> (53.7-56.4)	53.2 (51.5-54.9)	57.0 (55.1-58.8)
<b>Comportamientos sexuales</b>									
Porcentaje de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales alguna vez.	<b>31.8</b> (29.9-33.8)	38.4 (35.9-41.0)	25.7 (24.0-27.4)	<b>63.7</b> (61.3-66.0)	68.6 (65.7-71.4)	59.1 (56.6-61.6)	<b>41.9</b> (39.9-44.0)	48.1 (45.7-50.4)	36.3 (34.2-38.4)
Porcentaje de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 años (entre aquellos que tuvieron relaciones sexuales alguna vez).	<b>52.7</b> (51.2-54.2)	60.0 (57.2-62.8)	42.2 (38.9-45.5)	<b>20.2</b> (17.9-22.6)	27.2 (23.9-30.8)	12.4 (10.9-14.2)	<b>35.9</b> (34.1-37.8)	44.1 (41.1-47.1)	25.7 (24.1-27.3)
Porcentaje de estudiantes que usaron preservativo al tener relaciones sexuales (entre aquellos que tuvieron relaciones sexuales alguna vez).	<b>79.9</b> (78.1-81.5)	82.3 (79.9-84.4)	76.5 (74.1-78.7)	<b>76.7</b> (75.1-78.3)	81.4 (79.2-83.4)	71.9 (69.5-74.2)	<b>78.3</b> (76.9-79.5)	81.9 (80.1-83.5)	73.9 (72.4-75.4)
Porcentaje de estudiantes que han quedado embarazadas o que han dejado embarazada a alguien una o más veces.	<b>2.0</b> (1.7-2.4)	2.2 (1.8-2.6)	1.9 (1.5-2.3)	<b>3.6</b> (3.1-4.3)	3.7 (2.9-4.8)	3.5 (2.9-4.3)	<b>2.5</b> (2.2-2.9)	2.7 (2.3-3.1)	2.4 (2.0-2.8)
<b>Consumo de tabaco</b>									
Porcentaje de estudiantes que consumieron algún producto de tabaco al menos un día en los últimos 30 días.	<b>16.0</b> (15.0-17.1)	13.7 (12.5-15.0)	18.0 (16.6-19.5)	<b>29.8</b> (28.3-31.4)	29.9 (27.3-32.7)	29.8 (28.0-31.6)	<b>20.4</b> (19.4-21.5)	18.8 (17.6-20.1)	21.8 (20.5-23.0)
Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos, al menos un día en los últimos 30 días.	<b>14.6</b> (13.6-15.7)	12.1 (11.0-13.3)	16.8 (15.4-18.3)	<b>28.3</b> (26.8-29.8)	28.0 (25.4-30.8)	28.5 (26.8-30.3)	<b>19.0</b> (18.0-20.0)	17.2 (16.0-18.4)	20.5 (19.3-21.8)

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

Comparación: 2007 - 2012 - 2018

Violencia y lesiones no intencionales									
Porcentaje de estudiantes que participaron de alguna pelea al menos una vez en los últimos 12 meses.	<b>24.9</b> (23.8-26.1)	33.2 (31.3-35.1)	17.2 (16.0-18.5)	<b>24.0</b> (22.2-25.9)	33.6 (30.8-36.5)	15.1 (13.4-16.9)	<b>24.6</b> (23.4-25.9)	33.3 (31.5-35.1)	16.5 (15.2-17.9)
Porcentaje de estudiantes que fueron heridos de gravedad al menos una vez en los últimos 12 meses.	<b>32.3</b> (31.2-33.5)	37.4 (35.1-39.7)	27.5 (25.9-29.3)	<b>34.9</b> (34.0-35.9)	40.3 (38.4-42.3)	30.1 (28.6-31.7)	<b>33.2</b> (32.3-34.0)	38.3 (36.6-40.1)	28.4 (26.9-29.9)
Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados en la escuela (últimos 12 meses)	<b>23.2</b> (22.4-23.9)	20.0 (19.1-20.9)	25.9 (24.8-27.0)	<b>18.7</b> (17.5-20.0)	16.5 (15.1-18.0)	20.6 (18.7-22.6)	<b>21.7</b> (21.0-22.5)	18.9 (18.2-19.6)	24.2 (23.1-25.3)
Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados fuera de la escuela (últimos 12 meses)	<b>20.3</b> (19.4-21.2)	18.3 (16.8-19.9)	22.0 (21.2-22.8)	<b>24.2</b> (22.9-25.5)	23.5 (21.4-25.7)	24.8 (23.2-26.4)	<b>21.5</b> (20.7-22.4)	20.0 (18.6-21.4)	22.9 (22.0-23.7)
Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados por internet (últimos 12 meses)	<b>21.1</b> (19.9-22.2)	15.9 (14.6-17.2)	25.7 (24.1-27.4)	<b>23.4</b> (22.3-24.7)	17.8 (16.4-19.3)	28.6 (27.0-30.2)	<b>21.8</b> (20.9-22.8)	16.5 (15.4-17.6)	26.6 (25.3-27.9)
Seguridad Vial									
Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez usaron cinturón de seguridad en un vehículo a motor conducido por otra persona, en los últimos 30 días (entre aquellos que viajaron en un vehículo conducido por otra persona)	<b>56.5</b> (54.5-58.4)	54.5 (52.3-56.7)	58.3 (56.0-60.6)	<b>58.6</b> (55.8-61.3)	59.2 (55.0-63.3)	57.8 (55.3-60.3)	<b>57.1</b> (55.2-59.0)	56.0 (53.6-58.4)	58.2 (56.2-60.1)
Porcentaje de estudiantes que viajaron en un vehículo a motor en el que el conductor había tomado alcohol, durante los últimos 30 días (entre aquellos que se subieron a un vehículo conducido por otra persona)	<b>26.7</b> (25.4-28.0)	28.5 (26.7-30.4)	25.1 (23.5-26.7)	<b>34.8</b> (33.1-36.4)	37.0 (34.6-39.4)	32.6 (30.4-34.9)	<b>29.3</b> (28.1-30.5)	31.3 (29.6-33.1)	27.5 (26.0-29.0)
Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez usaron casco cuando anduvieron en moto, durante los últimos 30 días (entre aquellos que anduvieron en moto)	<b>50.2</b> (47.8-52.6)	50.0 (47.3-52.7)	50.5 (47.4-53.7)	<b>51.6</b> (48.8-54.5)	53.2 (49.9-56.5)	49.7 (46.5-52.9)	<b>50.7</b> (48.5-52.9)	51.1 (48.8-53.3)	50.3 (47.5-53.1)
Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez usaron casco cuando anduvieron en bicicleta, durante los últimos 30 días (entre aquellos que anduvieron en bicicleta)	<b>88.0</b> (86.7-89.1)	88.1 (86.1-89.8)	88.0 (86.3-89.6)	<b>90.4</b> (89.4-91.3)	90.9 (89.5-92.2)	89.8 (87.8-91.5)	<b>88.7</b> (87.7-89.6)	89.0 (87.5-90.3)	88.6 (87.2-89.8)

COMPARACIÓN 2007 - 2012 - 2018 Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años									
	EMSE 2007			EMSE 2012			EMSE 2018		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
Consumo de alcohol									
Porcentaje de estudiantes que bebieron alcohol durante los últimos 30 días.	<b>51.8</b> (45.6-57.8)	55.4 (47.2-63.3)	49.0 (43.2-54.8)	<b>50.0</b> (47.6-52.5)	49.3 (46.3-52.2)	50.7 (47.8-53.7)	<b>47.7</b> (46.1-49.4)	44.9 (43.1-46.8)	50.3 (48.3-52.3)
Porcentaje de estudiantes que se emborracharon alguna vez en la vida.	<b>28.9</b> (25.0-33.2)	30.9 (25.3-37.2)	27.1 (22.8-31.7)	<b>27.9</b> (26.0-29.9)	28.9 (26.4-31.6)	26.8 (24.7-28.9)	<b>28.5</b> (26.9-30.2)	26.1 (23.9-28.4)	30.7 (28.9-32.5)
Porcentaje de estudiantes que bebieron alcohol antes de los 14 años (de los que bebieron alguna vez)	<b>72.8</b> (67.6-77.5)	71.9 (65.7-77.4)	73.9 (67.3-79.5)	<b>75.9</b> (74.7-77.1)	78.7 (76.7-80.5)	73.3 (71.5-75.0)	<b>77.1</b> (75.9-78.4)	79.7 (77.9-81.5)	74.7 (73.0-76.4)
Porcentaje de estudiantes que bebieron por lo general 2 o más tragos los días que bebieron alcohol (entre aquellos que bebieron alcohol en los últimos 30 días)	<b>35.3</b> (30.4-40.3)	35.1 (29.3-40.9)	35.8 (28.7-42.9)	<b>62.9*</b> (61.3-64.4)	63.4 (61.0-65.8)	62.4 (60.3-64.4)	<b>63.1</b> (61.1-65.1)	60.4 (58.2-62.5)	65.4 (62.2-68.4)

\* Diferencia estadísticamente significativa respecto al total nacional de la edición anterior

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

Comparación: 2007 - 2012 - 2018

COMPARACIÓN 2007 - 2012 - 2018 Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años									
	EMSE 2007			EMSE 2012			EMSE 2018		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Peso corporal</b>									
Porcentaje de estudiantes con bajo peso (<-2DE de la media para IMC según edad y sexo).	-	-	-	<b>2.1</b> (1.7-2.6)	2.1 (1.7-2.7)	2.1 (1.6-2.9)	<b>2.3</b> (1.9-2.7)	2.6 (2.1-3.2)	2.1 (1.5-2.9)
Porcentaje de estudiantes con sobrepeso (>+1 DE de la media para IMC según edad y sexo).	24.5 (21.6-28.1)	32.4 (29.0-36.0)	17.6 (13.9-23.0)	28.6* (26.8-30.4)	35.9 (33.4-38.4)	21.8 (19.7-24.1)	33.1* (31.9-34.3)	39.1 (37.3-40.9)	27.8 (25.5-30.2)
Porcentaje de estudiantes con obesidad (>+2 DE de la media para IMC según edad y sexo).	4.4 (3.2-6.1)	6.5 (4.5-9.3)	2.6 (1.3-5.2)	5.9* (5.1-6.8)	8.3 (7.1-9.8)	3.6 (2.8-4.7)	7.8* (7.2-8.4)	10.6 (9.6-11.8)	5.3 (4.6-6.0)
<b>Alimentación</b>									
Porcentaje de estudiantes que consumieron en lugares de comida rápida 3 o más días en los últimos 7 días.	7.4 (4.7-11.4)	7.3 (4.5-11.6)	7.0 (4.2-11.5)	6.8 (5.8-7.9) 7.0 (5.4-9.2)		6.6 (5.8-7.4)	10.7* (9.8-11.6) 10.5 (9.4-11.8)	10.7 (9.6-12.0)	
<b>Consumo de drogas</b>									
Porcentaje de estudiantes que consumieron marihuana una o más veces durante su vida.	-	-	-	8.4 (7.4-9.6)	10.6 (8.8-12.6)	6.5 (5.6-7.5)	8.2 (7.4-9.2)	8.4 (7.3-9.7)	7.9 (6.9-9.1)
Porcentaje de estudiantes que consumieron drogas alguna vez antes de los 14 años (entre aquellos que consumieron alguna vez).	-	-	-	62.0 (54.3-69.1)	61.8 (52.3-70.5)	61.7 (54.5-68.4)	54.6 (50.4-58.8)	56.7 (50.5-62.8)	52.2 (47.9-56.5)

COMPARACIÓN 2007 - 2012 - 2018 Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años									
	EMSE 2007			EMSE 2012			EMSE 2018		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Salud Mental</b>									
Porcentaje de estudiantes que consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse en los últimos 12 meses.	16.1 (12.9-19.8)	12.7 (8.7-18.1)	19.0 (15.6-22.9)	16.9 (15.1-18.9)	11.0 (9.2-13.1)	22.3 (20.3-24.3)	21.6* (20.7-22.4)	13.0 (12.0-14.1)	29.3 (28.1-30.6)
Porcentaje de estudiantes que intentaron suicidarse al menos una vez en los últimos 12 meses.	-	-	-	16.2 (14.8-17.8)	12.9 (10.7-15.6)	18.9 (17.2-20.9)	15.5 (14.6-16.4)	10.4 (9.3-11.6)	19.9 (18.9-21.1)
Porcentaje de estudiantes que no tiene amigos muy cercanos.	4.5 (3.5-5.6)	4.7 (3.4-6.5)	4.1 (3.0-5.5)	5.2 (4.4-6.0)	6.1 (4.9-7.5)	4.3 (3.5-5.3)	5.1 (4.7-5.6)	5.5 (5.0-6.1)	4.8 (4.2-5.4)
<b>Actividad física</b>									
Porcentaje de estudiantes que estuvieron activos al menos 60 minutos por día durante los últimos 7 días.	12.7 (9.8-16.3)	18.2 (13.5-24.2)	7.9 (5.6-11.2)	16.7 (15.8-17.7)	21.2 (20.0-22.6)	12.4 (11.3-13.7)	16.9 (16.1-17.7)	20.5 (19.4-21.7)	13.5 (12.7-14.3)
Porcentaje de estudiantes que fueron a clases de educación física en la escuela 3 o más días a la semana durante el último año escolar.	18.8 (14.6-23.8)	20.4 (16.0-25.6)	17.4 (12.6-23.6)	25.9* (23.9-28.0)	28.6 (25.5-32.0)	23.3 (21.8-24.9)	37.9* (36.2-39.7)	40.8 (38.6-43.0)	35.2 (33.3-37.1)
Porcentaje de estudiantes que pasaron 3 o más horas sentados durante un día típico habitual.	49.2 (41.6-56.8)	44.0 (37.1-51.1)	53.9 (44.4-63.1)	50.3 (48.6-52.0)	47.1 (44.3-49.9)	53.4 (51.1-55.7)	53.8 (51.8-55.7)	51.2 (49.2-53.2)	56.3 (54.1-58.4)

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

Comparación: 2007 - 2012 - 2018

COMPARACIÓN 2007 - 2012 - 2018 Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años									
	EMSE 2007			EMSE 2012			EMSE 2018		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Factores protectores</b>									
Porcentaje de estudiantes que faltaron a la escuela sin permiso una o más veces en los últimos 30 días.	34.0 (29.2-38.8)	36.1 (29.4-42.7)	31.9 (26.9-36.9)	30.7 (29.0-32.5)	32.0 (29.5-34.6)	29.4 (27.4-31.4)	26.3* (24.3-28.5)	27.9 (26.0-29.9)	24.7 (22.2-27.3)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores siempre o casi siempre comprendieron sus problemas y preocupaciones en los últimos 30 días.	-	-	-	48.2 (46.2-50.2)	46.2 (43.5-48.9)	49.9 (47.7-52.1)	42.8* (41.3-44.4)	44.5 (42.9-46.1)	41.5 (39.6-43.3)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o cuidadores sabían realmente lo que hacían en su tiempo libre siempre o casi siempre en los últimos 30 días.	-	-	-	<b>54.0</b> (52.0-56.0)	49.4 (46.8-52.1)	58.3 (55.9-60.6)	<b>55.3</b> (53.7-57.0)	53.8 (51.8-55.8)	56.8 (54.5-59.2)
<b>Comportamientos sexuales</b>									
Porcentaje de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales alguna vez.	<b>26.0</b> (21.2-31.5)	34.9 (27.3-43.4)	18.8 (15.1-23.2)	<b>36.9*</b> (34.0-39.8)	43.5 (40.1-47.0)	30.7 (27.7-33.9)	<b>31.8*</b> (29.9-33.8)	38.4 (35.9-41.0)	25.7 (24.0-27.4)
Porcentaje de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 años (entre aquellos que tuvieron relaciones sexuales alguna vez).	<b>55.9</b> (44.6-66.7)	61.3 (49.5-71.8)	48.1 (35.7-60.8)	<b>58.8</b> (55.5-62.0)	66.5 (62.8-70.0)	49.2 (44.9-53.6)	<b>52.7*</b> (51.2-54.2)	60.0 (57.2-62.8)	42.2 (38.9-45.5)
Porcentaje de estudiantes que usaron preservativo al tener relaciones sexuales alguna vez.	<b>78.9</b> (70.7-85.3)	81.7 (74.8-87.0)	75.0 (60.6-85.4)	<b>75.8</b> (71.7-79.4)	77.1 (71.5-81.8)	74.0 (68.7-78.6)	<b>79.9</b> (78.1-81.5)	82.3 (79.9-84.4)	76.5 (74.1-78.7)

COMPARACIÓN 2007 - 2012 - 2018 Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años									
	EMSE 2007			EMSE 2012			EMSE 2018		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Consumo de tabaco</b>									
Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos, al menos un día en los últimos 30 días.	<b>21.0</b> (17.6-24.8)	19.8 (15.2-25.4)	21.9 (18.1-26.4)	<b>18.8*</b> (17.7-20.0)	17.0 (15.4-18.7)	20.5 (19.0-22.0)	<b>14.6*</b> (13.6-15.7)	12.1 (11.0-13.3)	16.8 (15.4-18.3)
Porcentaje de estudiantes que refirieron que otra persona fumó en su presencia al menos un día en los últimos 7 días.	<b>75.9</b> (72.8-78.8)	75.2 (70.2-79.5)	76.5 (74.1-78.8)	<b>73.4</b> (71.8-75.0)	70.2 (68.0-72.3)	76.4 (74.6-78.2)	<b>63.4*</b> (62.2-64.7)	60.3 (58.6-62.0)	66.2 (64.6-67.7)
<b>Violencia y lesiones no intencionales</b>									
Porcentaje de estudiantes que participaron de alguna pelea al menos una vez en los últimos 12 meses.	<b>29.8</b> (26.0-34.0)	42.8 (37.7-48.1)	18.6 (14.3-23.8)	<b>34.1</b> (32.5-35.7)	44.2 (41.7-46.7)	24.7 (23.1-26.3)	<b>24.9*</b> (23.8-26.1)	33.2 (31.3-35.1)	17.2 (16.0-18.5)
Porcentaje de estudiantes que fueron heridos de gravedad al menos una vez en los últimos 12 meses.	<b>34.4</b> (31.4-37.6)	44.1 (40.0-48.3)	26.1 (22.6-29.9)	<b>33.3</b> (31.6-35.1)	42.1 (39.9-44.4)	25.2 (23.1-27.4)	<b>32.3</b> (31.2-33.5)	37.4 (35.1-39.7)	27.5 (25.9-29.3)
<b>Seguridad vial</b>									
Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez usaron cinturón de seguridad en un vehículo a motor conducido por otra persona, en los últimos 30 días (entre aquellos que viajaron en un vehículo conducido por otra persona)	-	-	-	<b>40.9</b> (38.7-43.1)	40.2 (37.1-43.4)	41.4 (39.1-43.8)	<b>56.5*</b> (54.5-58.4)	54.5 (52.3-56.7)	58.3 (56.0-60.6)
Porcentaje de estudiantes que viajaron en un vehículo a motor en el que el conductor había tomado alcohol, durante los últimos 30 días (entre aquellos que se subieron a un vehículo conducido por otra persona)	-	-	-	<b>31.9</b> (29.6-34.3)	35.3 (32.3-38.4)	28.8 (26.3-31.5)	<b>26.7*</b> (25.4-28.0)	28.5 (26.7-30.4)	25.1 (23.5-26.7)



# CONCLUSIONES

2018 • RESUMEN EJECUTIVO

Principales resultados de la EMSE 2018  
y comparación con las ediciones previas





# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

### Interpretación de resultados y conclusiones

## CONSUMO DE ALCOHOL

- En la EMSE 2018, el 54,1% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió una bebida alcohólica al menos 1 día en el último mes, siendo mayor en el grupo de 16-17 años (67,6%) que en de 13-15 (47,7%). En el grupo de 13-15 años el consumo de alcohol es mayor en las mujeres que en los varones (50,3% vs 44,9%), lo que representa un cambio con respecto a la edición anterior en la cual no había diferencias por sexo.
- De los que consumieron alcohol, 2 de cada 3 bebió dos o más tragos cada vez que tomó, indicador que se conoce como consumo episódico excesivo de alcohol (CEEA), el cual fue mayor en el grupo de 16-17 años (73,9%) con respecto al de 13-15 (63,1%). Este indicador se mantuvo estable en la última edición respecto a la previa (62,9%).
- El 37,3% de los estudiantes se emborracharon y este indicador también fue mayor en el grupo de 16-17 años (56,0%) que en de 13-15 (28,5%). La borrachera fue mayor en las mujeres que en varones en el grupo de 13-15 años (30,7% vs 26,1%), lo que representa un cambio con respecto a la edición anterior en la que no se registraban diferencias según sexo.
- 2 de cada 3 estudiantes se iniciaron en el consumo de alcohol antes de los 14 años, siendo mayor en varones que en mujeres en todos los grupos de edad.

**Aunque no hubo un aumento del consumo de alcohol en los estudiantes de 13 a 15 años respecto de la edición previa de EMSE, si se observó que las mujeres consumen más alcohol que los varones, lo que no se evidenciaba en la edición anterior de la encuesta .**

**El consumo de alcohol aumentó con la edad lo que se evidencia sistemáticamente en todos los indicadores el consumo es mayor en los adolescentes de 16 a 17 respecto de los de 13 a 15.**

**A diferencia de lo observado en la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, donde el CEEA aumentó respecto a la edición previa, esto no se evidenció en los adolescentes, según los resultados de esta encuesta. Sin embargo no deja de ser alarmante que 2 de cada 3 adolescentes de 13 a 15 años tomó altos volúmenes de alcohol cada vez que toma (2 o más tragos).**

## SOBREPESO y OBESIDAD

- En la EMSE 2018 el 30,3 % de los estudiantes de 13 a 17 años presentó sobrepeso y el 7,4% obesidad, siendo ambos indicadores mayores en varones que en mujeres. El exceso de peso (la sumatoria de sobrepeso y obesidad) fue por lo tanto de 37,7% en los jóvenes de 13 a 17 años. El sobrepeso fue mayor en los chicos de 13 a 15 años que en los de 16 y 17 años (33,1% vs 25,1%). No hubo diferencias en la prevalencia de obesidad entre dichos grupos de edad.
- Se observó un aumento tanto del sobrepeso como de la obesidad a lo largo de las tres ediciones de la EMSE. El sobrepeso pasó de 24,5% (2007) a 28,6% (2012) a 33,1% (2018) y la obesidad pasó de 4,4% (2007) a 5,9% (2012) a 7,8% (2018), siempre considerando a los adolescentes de 13 a 15 años.
- En las tres ediciones de la encuesta, el sobrepeso fue mayor en varones que en mujeres. En el caso de la prevalencia de obesidad esto se observó en la 2° y 3° edición de la encuesta.

**En consonancia con otras encuestas nacionales, como la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019 y la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, se observó un aumento progresivo y sostenido del sobrepeso y la obesidad en los adolescentes y con predominio en los varones.**

**El exceso de peso, aunque es muy prevalente, es menor en los adolescentes de 16 a 17 respecto de los menores de 13 a 15.**

## ALIMENTACION

- Según los resultados de la EMSE 2018, se observó que en la última semana: el 21,0% los estudiantes de 13 a 17 consumió frutas dos o más veces por día, evidenciándose mayor consumo en el grupo de 13 a 15 años respecto del grupo de 16 – 17 años. El 10,5% de los adolescentes de 13 a 17 años consumió verduras tres o más veces diarias, sin diferencias según grupo etario.
- el 33,2% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió bebidas azucaradas 1 o más veces al día en la última semana, sin diferencias entre los chicos de 13 a 15 respecto de los de 16 a 17 años.
- el 9,9% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió en lugares de comida rápida 3 o más días en la última semana, siendo mayor en el grupo de 13 a 15 años (10,7%) que en los de 16 - 17 años (8,4%).
- en el grupo de 13-15 años se observó un aumento del consumo de alimentos en cadenas de comida rápida respecto de la edición anterior, aumentando de 6,8% en la EMSE 2012 a 10,7% en la EMSE 2018.

**En consonancia con otras encuestas nacionales, como la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019 y la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, se observó un bajo consumo de frutas y verduras en los adolescentes en general. El consumo de alimentos en cadenas de comida rápida fue mayor en los chicos de 13 a 15 años respecto de los de 16 a 17.**

**Aunque no puede compararse el consumo de bebidas azucaradas respecto de ediciones anteriores de la encuesta, dado que en la EMSE 2012 se analizó el consumo mensual y en la actual edición se analizó el consumo semanal, resulta muy alarmante el hecho de que un tercio de los adolescentes toma bebidas con azúcar diariamente.**

**El aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en cadenas de comida rápida, en chicos de 13 a 15 años, respecto de la edición anterior de la EMSE, resulta consistente con múltiples fuentes de información que muestran el empeoramiento de los patrones alimentarios en la población argentina.**

## CONSUMO DE DROGAS

- En la EMSE 2018 el 38,6% de los jóvenes de 13 a 17 años consumió alguna droga antes de los 14 años.
- El 13,3% de los estudiantes de 13 a 17 años refirió haber consumido marihuana alguna vez en su vida, y el 9,1% refirió haber consumido marihuana en el último mes
- El consumo de marihuana tanto alguna vez en la vida como en el último mes resultó aproximadamente el triple en el grupo de 16 a 17 años respecto de los de 13 a 15 años (24,3% vs. 8,2% y 15,4% vs. 6,2% respectivamente).

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

### Interpretación de resultados y conclusiones

- Los varones de 16 a 17 años consumieron más marihuana que las mujeres, tanto en el indicador de consumo alguna vez en la vida como en el de consumo del último mes.
- En el grupo de 13 a 15 años no hubo diferencias en cuanto al consumo de marihuana alguna vez en la vida ni en cuanto a la edad de inicio en las drogas ilegales, respecto de la edición previa de la EMSE.

**Resulta alarmante que casi 4 de cada 10 adolescentes de 13 a 17 años probó alguna droga ilegal antes de los 14 años. También, que 1 de cada 4 adolescentes de 16 a 17 años probó la marihuana y que 1 de cada 6 la consume en la actualidad.**

**El consumo de marihuana es especialmente preocupante en varones ya que resultó mayor que el de las mujeres, a diferencia de lo sucedido con el consumo de tabaco y alcohol, según se observó en esta misma encuesta.**

### SALUD MENTAL

- En la EMSE 2018 el 21,5% de los estudiantes de 13 a 17 años consideró seriamente la posibilidad de suicidarse en el último año, siendo más del doble en mujeres que en varones (28,6% vs 13,7%). Este comportamiento también se reflejó en los grupos etarios analizados.
- El 15,2% de los jóvenes de 13 a 17 años hizo al menos un intento de suicidio en los últimos 12 meses, sin diferencias en los grupos de edad y resultando mayor en las mujeres respecto de los varones.
- En el grupo de 13-15 años se observó un aumento de la ideación suicida (quienes consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse), respecto de la edición anterior de la EMSE (21,6% vs 16,9% respectivamente); para el indicador de intento de suicidio no hubo diferencias.

**Si bien es cierto que los intentos de suicidio no aumentaron en la EMSE 2018 respecto de la EMSE de 2012, la ideación suicida (es decir, el hecho de considerar la posibilidad de hacerlo) creció de modo alarmante, especialmente entre las adolescentes mujeres.**

**Aunque los intentos de suicidio no aumentaron, esto no deja de resultar un grave problema si se tiene en cuenta que casi 1 de cada 6 adolescentes hizo un intento en el último año.**

### ACTIVIDAD FISICA

- En la EMSE 2018, el 16,5% de los estudiantes de 13 a 17 años fueron físicamente activos, siendo más alto el porcentaje en varones que en mujeres (20,4% vs 12,9%), sin diferencias entre los grupos de 13 a 15 y de 16 a 17 años.
- El 55,3% de los jóvenes de 13 a 17 pasaron al menos 3 horas al día sentados fuera del horario escolar, indicador de comportamiento sedentario que resultó mayor en las mujeres que en los varones (57,7% vs 52,8% respectivamente).
- El 37,5% de los jóvenes de 13 a 17 años fue a clases de educación física en la escuela 3 o más días a la semana, durante el último año escolar.

- En el grupo de 13-15 años no hubo diferencias respecto de las ediciones anteriores en cuanto a jóvenes físicamente activos ni tampoco en cuanto al tiempo que pasaron sentados en un día típico. Por el contrario, sí se observó un aumento progresivo a lo largo de las tres ediciones de la encuesta respecto de los estudiantes de 13 a 15 años que fueron a clases de educación física en la escuela, 3 o más días a la semana durante el último año escolar (18,8% EMSE 2007; 25,9% EMSE 2012 y 37,9% EMSE 2018).

**Si bien resulta alentador el aumento del porcentaje de estudiantes que refirieron tener al menos 3 clases de educación física en la escuela, los porcentajes de jóvenes físicamente inactivos y sedentarios continúan siendo elevados y alarmantes; resultan especialmente preocupantes los valores más elevados en mujeres.**

### COMPORTAMIENTO SEXUALES

- En la EMSE 2018, el 41,9% de los estudiantes de 13 a 17 años tuvieron relaciones alguna vez en su vida, siendo mayor el porcentaje en varones que en mujeres (48,1% vs 36,3% respectivamente). Se observó que el indicador resultó directamente proporcional a la edad: tuvieron relaciones sexuales el 31,8% de los estudiantes de 13-15 y el 63,7% de los estudiantes del grupo de 16-17 años, resultando en ambos casos mayor entre varones.
- El 35,9% de los estudiantes de 13 a 17 tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 años. También fue más frecuente en los varones que en las mujeres (44,1% vs. 25,7% respectivamente)
- El 78,3% de los estudiantes de 13 a 17 años refirieron usar preservativos cuando tuvieron relaciones sexuales, un reporte que es menor en las mujeres que en los varones (73,9% vs 81,9%).
- El 2,5% de los estudiantes de 13 a 17 años refirió haber quedado embarazada o haber dejado embarazada a alguien, sin diferencias según sexo y siendo mayor el porcentaje en el grupo de 16-17 años (3,6%) con respecto a 13-15 (2,0%).
- En el grupo de 13-15 años se observó una reducción del porcentaje de estudiantes que habían tenido relaciones sexuales al momento de la encuesta (36,9% EMSE 2012 y 31,8% EMSE 2018) y también una disminución del porcentaje de estudiantes que inició las relaciones sexuales antes de los 14 años (58,8% EMSE 2012 y 52,7% EMSE 2018).

**Los varones refirieron con mayor frecuencia que las mujeres, haber tenido relaciones sexuales y haberse iniciado sexualmente antes de los 14 años.**

**Se observó un descenso en el porcentaje de las relaciones sexuales al momento de la encuesta y de los adolescentes que se iniciaron sexualmente antes de los 14 años, respecto de la EMSE 2012.**

**No hubo cambios en la tendencia del uso de preservativo y sin embargo, 2 de cada 10 estudiantes no los utiliza en sus relaciones sexuales.**

**El embarazo adolescente aumentó con la edad y fue reportado por el 2,0% de estudiantes de 13 a 15 años y por aproximadamente el doble de estudiantes de 16 a 17 años (3,6%).**

# ARGENTINA

## 2018 • RESUMEN EJECUTIVO

### Interpretación de resultados y conclusiones

#### CONSUMO DE TABACO

- En la EMSE 2018, el 20,4% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió algún producto de tabaco durante los últimos 30 días, siendo más frecuente en mujeres que en varones (21,8% vs 18,8%). También se observó que este indicador casi se duplicó en el grupo de 16 a 17 años, respecto de los de 13 a 15 (29,8% y 16,0% respectivamente).
- Un patrón similar se observó entre los consumidores de cigarrillos, donde el 19,0% de los estudiantes de 13 a 17 años consumieron cigarrillos durante los últimos 30 días, resultando más frecuente en mujeres que en varones (20,5% vs 17,2%). Se evidenció que el indicador resultó aproximadamente el doble entre los estudiantes de 16 a 17 años respecto de los de 13 a 15 (28,3% vs. 14,6%).
- En el grupo de 13-15 años se observó un descenso progresivo y continuo del consumo de cigarrillos que pasó del 21,0% en la EMSE 2007 al 18,8% en la EMSE 2012 y 14,6% en la EMSE 2018. Desde la 2° edición de la encuesta, las mujeres siempre conservaron una prevalencia mayor que la de los varones.

*El consumo de tabaco en todas sus formas, y el de cigarrillos en particular, mostró una tendencia descendente entre los estudiantes de 13 a 15 años, en consonancia con lo observado en otras encuestas como la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Como también pudo observarse en la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 2018 (EMTJ) el consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco se encuentra en descenso, en los estudiantes de 13 a 15 años, preocupa la alta prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico que alcanzó al 7,1% de los estudiantes.*

*Un elemento a considerar es el crecimiento acelerado del consumo de tabaco en función de la edad, que se manifiesta en el hecho de que se duplica el consumo de cigarrillos y otras formas de tabaco entre los estudiantes de 16 a 17 años respecto de los de 13 a 15.*

*También es altamente preocupante la tendencia que viene observándose en todas las EMSE en cuanto al mayor consumo de tabaco en mujeres respecto de los varones, entre los estudiantes de 13 a 15 años. Sin embargo, también es destacable que esta diferencia desaparece en los jóvenes de 16 y 17 años, donde no se observan diferencias según sexo.*

#### VIOLENCIA Y LESIONES

- En la EMSE 2018 el 24,6% de los estudiantes de 13 a 17 años participó en una pelea en los últimos 12 meses, siendo mayor en varones que en mujeres (33,3% vs 16,5%). El 33,2% fue herido de gravedad en los últimos 12 meses, siendo también más frecuente en varones que en mujeres (38,3% vs 28,4%).
- Alrededor de 1 de cada 5 estudiantes de 13 a 17 años fueron intimidados tanto dentro de la escuela, como fuera de ella o por Internet en los últimos 12 meses (21,7% , 21,5% y 21,8% respectivamente). Las mujeres presentaron mayores porcentajes de intimidación en todos los casos, y con mayor diferencia que los varones en el indicador de intimidación por Internet (26,6 % vs 16,5%).

- En el grupo de 13-15 años no hubo cambios respecto de la edición anterior en el porcentaje que refirió heridas de gravedad. Sí hubo menor porcentaje de estudiantes que participaron en alguna pelea en los últimos 12 meses, pasando del 34,1% al 24,9% en las EMSE 2012 y 2018 respectivamente.

*Resulta alarmante que 1 de cada 4 estudiantes de 13 a 15 años refirió haber participado de una pelea en los últimos 12 meses, aunque se haya observado un descenso respecto de la EMSE 2012. Más alarmante aun es el hecho de que 1 de cada 3 haya reportado lesiones de gravedad, sin variaciones respecto de ediciones anteriores de la encuesta.*

*Las lesiones por violencia interpersonal son altamente preocupantes, con especial foco en los varones que son los más afectados.*

*Si bien no es posible comparar las tasas de intimidación con las ediciones anteriores, dado que los indicadores fueron modificados para esta nueva edición de la encuesta, resulta un elemento a tener en cuenta la alta prevalencia de intimidación que los adolescentes sufren tanto en la escuela, como fuera de la escuela y por Internet, y en donde en todos los casos las principales víctimas son las mujeres.*

#### SEGURIDAD VIAL

*Según los resultados de la EMSE 2018, durante el último mes:*

- el 57,1% de los estudiantes de 13 a 17 años nunca o rara vez usaron cinturón de seguridad cuando se subieron a un vehículo a motor conducido por otra persona.
- el 29,3% de los estudiantes de 13 a 17 años refirieron haber viajado en un vehículo a motor en el que el conductor había tomado alcohol, siendo mayor en varones que en mujeres. Se observó mayor porcentaje en el grupo de 16-17 años (34,8%) con respecto al de 13-15 (26,7%).
- el 50,7% refirió nunca o rara vez usar casco al andar en moto y el 88,7% refirió nunca o rara vez usar el casco al andar en bicicleta.
- en el grupo de 13 a 15 años se observaron diferencias respecto de la EMSE 2012: aumentó el porcentaje de quienes nunca o rara vez usaron cinturón de seguridad en un vehículo manejado por otra persona (56,5% EMSE 2018 y 40,9% EMSE 2012) mientras que disminuyó el porcentaje de quienes viajaron en un vehículo a motor en el que el conductor había tomado alcohol (26,7% EMSE 2018 y 31,9% EMSE 2012).

*Preocupa el bajo uso de cinturón de seguridad en vehículos cuando los adolescentes son acompañantes de un conductor, dado que casi 6 de cada 10 refirieron no usar cinturón en un vehículo con otro conductor. El indicador empeoró respecto de la EMSE 2012.*

*Otra conducta de riesgo vial y que resulta mayor a la observada en adultos, según la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 (ENFR), es el bajo uso de casco en moto, que fue referido solo por la mitad de los estudiantes. El casco en bicicleta casi nunca es utilizado ni por adolescentes ni por adultos según la 4° ENFR.*

*También requiere ser destacado que casi un tercio de los adolescentes refirieron que el conductor tomó antes de conducir, un porcentaje menor al observado en la anterior edición de la encuesta. Los resultados evidencian que en jóvenes el indicador resultó mayor que en adultos, según la 4° ENFR.*



